

性传播感染 (STI) 信息手册: 淋病 (Gonorrhoea)

什么是淋病 (Gonorrhoea) ?

淋病是一种感染，可以在与患者进行无保护的阴道性交、肛交和口交时造成的人与人之间传播。它可以感染喉咙、肛门（肛肠的末端）、阴茎、阴道和眼睛。

淋病是一种常见的性传播感染(STI)，通常没有任何症状。这意味着除非您接受性传播感染测试，否则您不会知道自己患有此病。即使没有症状，它还是会传播的。

如果没有适当的治疗，淋病有时会导致严重的健康问题。这些包括：

- 胃痛（盆腔炎）
- 睾丸（阴丸）疼痛肿胀
- 发生在子宫外的妊娠（宫外孕）
- 怀孕困难（不育）

什么情况下会感染淋病 (Gonorrhoea) ?

淋病会通过与您进行阴道性交、肛交或口交时传播。使用安全套和/或口腔膜等防护措施是保护您免受淋病感染的极好和有效方法。

如何预防淋病 (Gonorrhoea) ?

- 在阴道性交、口交和肛交时使用安全套。安全套可以预防淋病的传播。确保在性伴侣之间和共用性玩具时更换安全套。
- 在口交时使用口腔膜。口腔膜将防止皮肤与皮肤接触并防止淋病传播。
- 如果您患有淋病，在开始治疗7天之后才可与人性交。
- 每 3-12 个月检测一次性传播感染和艾滋病病毒。这很重要，也是保持健康自信的性生活的一部分

如何检测淋病 (Gonorrhoea) ?


如果您有症状，可通过尿液样本或自行采集的拭子检测淋病。有时可能还需要采集咽拭子或自行采集的肛拭子。在进行性传播感染检测之前的60分钟内不要上厕所，这一点很重要。

您可以在当地医生、性健康诊所和一些大学健康诊所进行淋病检测。您可以拨打

1800 451 624（免费电话）[Sexual Health Infolink](#)，查找离您最近的服务。

淋病和其他性传播感染的检测并无痛楚。性传播感染检测简单、保密，也没有什么可羞愧的。

如果您的淋病检测呈阳性，请务必让您的性伴侣知道，以便他们也能接受检测和治疗。如果您在联系伴侣方面需要帮助，请咨询您的医生，请访问 [Let Them Know](#) 或拨打 [Sexual Health Infolink](#) 1800 451 624（免费电话）。



性传播感染 (STI) 信息手册: 淋病 (Gonorrhoea)

如何治疗淋病 (Gonorrhoea) ?

您的医生或护士可以使用抗生素 (注射剂和药片) 治疗淋病。

如果您的淋病检测结果呈阳性, 您要在治疗开始7天之后、您的症状都消失并且伴侣检测结果为阴性或在接受治疗才可以进行性交。治疗后3个月再进行另一次检查以确保您没有再次感染很重要。

哪里可以找到更多关于淋病 (Gonorrhoea) 和其他性传播感染 (STIs) 的信息?

有关淋病、其他性传播感染和性健康的信息和支持, 您可以拨打 [Sexual Health Infolink 1800 451 624](tel:1800451624) (免费电话) 与性健康护士

专家交谈。这是一项免费、保密和非评判性的服务。您还可以访问 International Student Health Hub。

如果您需要口译员来帮助您获得健康服务或信息, 请致电 131 450 联系 [Translating and Interpreting Service](#)。

Scan the QR code to find out more about gonorrhoea and STIs

